

BEREZNOWSKI A., KŁOS Z., TUREK B., STERNA J.,
ŻURAŃSKA A., MASTALERZ T.

*Leczenie złamań śródstawowych brzeżnych u koni
metodą artroskopową*

Athroscopic treatment of intraarticular chip fractures in horses

Złamania śródstawowe brzeżne są częstą przyczyną kulawizn u koni sportowych. Skuteczne leczenie tego typu złamań polega na usunięciu odłamku kostnego. Zastosowanie techniki artroskopii, przy której uraz operacyjny jest niewielki, pozwala na znaczne skrócenie okresu rehabilitacji pacjenta po zabiegu.

Zabiegi przeprowadzono w okresie od sierpnia 1999 r. do marca 2000 r. przy użyciu artroskopu firmy NOPA o średnicy 2,7 mm. Dane pacjentów poddanych artroskopii zestawiono w tabeli poniżej.

Nr klin. pacjenta	Rasa	Wiek (w latach)	Płeć	Użytkowanie konia	Lokalizacja złamania
94/99	xx	2	Ogier	Wyścigi	Staw pęcinowy – l.k.p.
111/99	Olden.	4	Wałach	Skoki	Staw pęcinowy – l.k.p.
137/99	xx	2	Ogier	Wyścigi	Staw nadgarstkowy prawy
138/99	xx	2	Klacz	Wyścigi	Staw pęcinowy – p.k.m.
139/99	xx	2	Klacz	Wyścigi	Staw pęcinowy – p.k.m.
141/99	sp.	3	Wałach	Skoki	Staw skokowy lewy
147/99	xx	3	Klacz	Wyścigi	Staw pęcinowy – l.k.m.
149/99	wlkp.	13	Wałach	Rekreacja	Staw kopytowy – p.k.p.
22/00	wlkp.	6	Klacz	Rekreacja	Staw kopytowy – l.k.p.
43/00	sp.	6	Wałach	WKKW	Staw pęcinowy – l.k.p.

W czterech przypadkach usunięto odłamki kości z jam stawowych przy pomocy artroskopu. W kolejnych czterech przypadkach zlokalizowano odłamki, lecz usunięto je narzędziami chirurgicznymi po otwarciu jamy stawu. Ze względu na rozmiary odłamów ich usunięcie z użyciem techniki artroskopowej nie było możliwe. W dwóch przypadkach (złamanie wyrostków prostowniczych kości kopytowych) nie udało się zlokalizować odłamków w jamach stawowych.

Wnioski:

1. Artroskopia jest dobrą metodą leczenia wybranych złamań śródstawowych brzeżnych u koni.
2. Niezbędna jest właściwa kwalifikacja przypadków do leczenia metodą artroskopową.