

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką, SGGW w Warszawie

JAGIELSKI D., LECHOWSKI R., HOFFMANN-JAGIELSKA M.

Wyniki chemioterapii chłoniakomięsaka psów

Results of lymphosarcoma chemotherapy in dogs

Stosunkowo duża w ostatnim czasie liczba rozpoznań chłoniakomięsaka oraz znacząca liczba właścicieli zainteresowanych leczeniem cytostatycznym swoich zwierząt skłoniła nas do porównania wyników stosowanych schematów chemioterapii.

W naszej Klinice w leczeniu formy wielogniskowej chłoniakomięsaka psów jako schematy pierwszego rzutu w okresie od maja 1997 roku do grudnia 1999 roku najczęściej wykorzystywane były COAP i L-ASP-VCAM. Leczeniu według tych schematów poddanych zostało 40 psów różnych ras i w różnym wieku.

W przypadku wystąpienia wznowy procesu nowotworowego stosowano różne schematy ratujące.

Schemat	Liczba leczonych zwierząt	Wiek [lata]	Odsetek całkowitych remisji [%]	Odsetek częściowych remisji [%]	Średni czas trwania remisji [dni]	Średni czas przeżycia [dni]
COAP	30	6,6 ±3,2	90	13	234 ±229	281 ±220
L-ASP-VCAM	10	4,6 ±3,3	60	30	193 ±165	205 ±158

W chwili opracowywania wyników przy życiu pozostawało 32,5% leczonych zwierząt. Wśród zwierząt leczonych schematem COAP 20% przeżyło jak dotąd powyżej jednego roku od momentu rozpoczęcia leczenia, analogiczny odsetek dla schematu L-ASP-VCAM wynosi 40%.

Nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy powyższymi schematami jeśli chodzi o czas trwania remisji i długość okresu przeżycia zwierząt leczonych. Należy zauważyć, iż znacząca część zwierząt nadal pozostaje przy życiu, wobec czego przedstawione powyżej wartości ulegają zmianie w miarę upływu czasu.

Stosowane są także inne schematy chemioterapii, jednak liczba pacjentów prowadzonych według nich jest zdecydowanie niższa.