

Katedra Chirurgii Zwierząt, SGGW w Warszawie

STERNA J.

Przydatność hemilaminectomii w leczeniu dyskropatii u psów chondrodystroficznych

Usefulness of the hemilaminectomy in the therapy of the chondrodystrophic dogs

W leczeniu dyskropatii u psów chondrodystroficznych poza metodami zachowawczymi stosowane są również operacyjne np.: fenestracja, pediclectomia, hemilaminectomia, laminectomia.

Hemilaminectomia i obustronna hemilaminectomia zostały użyte w leczeniu 18 psów chondrodystroficznych z rozpoznaniem na podstawie badania klinicznego i badań obrazujących (RTG, mielografia, MRJ) wypadnięciem jądra miażdżystego w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa. Psy w dniu operacji prezentowały 3 lub 4 stopień zaawansowania choroby wg Punzeta i Waldego trwający od 1 do 35 dni.

Jeden pies padł w kilka godzin po operacji. Wszystkie pozostałe odzyskały zdolność do chodzenia. Jeden dopiero po 3 miesiącach, pozostałe 16 zwierząt w czasie od 6-ciu godzin do 21 dni. U 4 psów wystąpiły powtórne zachorowania w przeciagu kilku miesięcy.

Hemilaminectomia jest skuteczną metodą operacyjnego leczenia wypadnięcia jądra miażdżystego.